



Признаки родовых травм у детей...

учитель-логопед – Почуева Н.А.

Обычно признаки родовой травмы видны уже в роддоме, сразу же после рождения ребенка:

- Синяки, кровоподтеки, кровоизлияния, подкожные гематомы, в том числе и точечные, мелкие на лице и шее, на груди и животике, на ногах и руках.

Простым и надежным признаком родовых травм является травматические сосудистые пятна:

а) сосудистые пятна на затылке и шее всегда свидетельствуют о повреждении шейного отдела позвоночника (о смещении шейных позвонков). Этот важный признак зарегистрирован, как **симптом Ефимова №1**;

б) сосудистые пятна на лбу говорят о мозговой травме черепа (**симптом Ефимова №2**).

Форма и размер этих пятен может быть различны, со временем они бледнеют, рассасываются и родители вздыхают спокойно. Но успокаиваться не надо.

Наличие таких пятен, даже если пятно впоследствии и рассосалось, всегда свидетельствует о родовой травме, которую надо лечить.

Признаки родовой травмы у детей первого года жизни:

- Необходимо обращать внимание на внешний вид ребенка: измененная форма головы (деформация головы), т.е. слишком большая голова (макрокrania) или, наоборот, слишком маленькая голова (микрокrania).

• **Микрокrania** - прямой признак родовой травмы головы.

• **Кривошея**, т.е. стойкие фиксированные повороты головы в одну и ту же сторону, иногда с наклоном. Это вызывается травмами мышц, связок или перекрутом в шейном отделе позвоночника.




Все это возникает иногда в процессе родов.

- Очень важный признак - **наличие красного пятна** на коже затылка или в области лба и переносицы. Это - посттравматические сосудистые пятна.
- Слабость и вялость мышц (гипотонус), распластанный, как у лягушки, животик.
- Отсутствие активных движений в руках или в ногах.
- Акушерский паралич руки - рука висит, как плеть, не двигается неделями, месяцами.
- Судорожные подергивания, вздрагивания рук, ног, туловища.
- Любые судороги у детей.
- Повышенный тонус мышц (гипертонус), общий или только конечностей: ноги или руки, согнутые в суставах, можно не полностью и лишь с трудом разогнуть.
- Беспричинный плач по ночам и беспокойство ребенка.
- Слабый крик, отсутствие нормального «здорового» крика ребенка.
- Отсутствие рефлекса сосания, когда ребенок не сосет.
- Отсутствие рефлекса глотания. (при этом ребенок сосет молоко, но не проглатывает его).
- Пища вываливается изо рта.
- Частые срыгивания.
- Рвота и тошнота (признаки тошноты у совсем маленьких деток - побледнение кожи, высовывание кончика языка, отказ от груди во время кормления).
- Запоры или постоянное подтекание кала и мочи у ребенка.
- Запрокинутая назад голова у ребенка (он либо спит с запрокинутой назад головой либо постоянно запрокидывает ее, находясь в вертикальном положении).

Признаки родовой травмы у детей от 1 года до 5 лет:

- Чрезмерно большая или чрезмерно маленькая голова.
- Частые кивательные движения головой назад.
- Ребенок бьет себя кулачком по голове либо бьется головой о стену.

- 
- Трудноуправляемость ребенка: он становится гиперактивным и расторможенным.
 - Плохо понимает родителей.
 - Может проявляться общая вялость, слабость, ребенок «как вареный».
 - И, наоборот, тонус может быть чересчур повышен в одной или в обеих конечностях.
 - Рекурвация локтевых или коленных суставов, т.е. их гиперподвижность - возможность переразгибания или, наоборот, чрезмерного сгибания.
 - Ребенок плохо самостоятельно ходит.
 - Ребенок плохо и мало говорит.
 - Мало интересуется окружающим, не умеет рассказывать, безынициативен, погружен в себя. Иногда у ребенка проявляется отрицательное отношение к окружающим. Проявляется ранний детский аутизм.
 - Страхи у детей, боязнь всего: ребенок боится чужих людей, боится быть один, боится громких звуков, животных, телевизора, лифта, высоты, боится качаться на качелях, подбрасываний и т.д.
 - Частые носовые кровотечения у ребенка.
 - Проблемы с глазами: косоглазие, снижение зрения и др. Или появление нистагмы - частых движений глазных яблок в вертикальном и горизонтальном положении, как это бывает при слежении глазами за движущимся поездом.
 - Глухота, снижение слуха.
 - Появление первых судорог после года жизни.
 - Тики глаз, гиперкинезы, т.е. повторяющиеся однообразные движения.
 - Навязчивые движения головы, рук, ног.
 - Эпилепсия, эписиндромы (судороги, похожие на эпилепсию, но эпилепсией не являющиеся) с потерей сознания или без потери.
 - Укачивание в транспорте, сопровождающееся рвотой, тошнотой.

- Обмороки, преобмороки.
- Абсансы - временное отключение сознания или внимания, как бы временные замирания ребенка.
- Высокая метеозависимость (ухудшение общего состояния или усиление имеющихся нарушений и симптомов под влиянием изменений погоды).
- Постоянные ОРВИ, ОРЗ (пневмонии, бронхиты, ангины, аденоиды - в основе своей могут иметь родовую травму).
- К ним же относятся всевозможные дыхательные расстройства (частое дыхание, нерегулярное дыхание и пр.)
- Нарушения в сердечно-сосудистой системе (например, редкий пульс или, наоборот, частый).
- Синюшность губ и носогубного треугольника - это проявление сердечной или сосудистой недостаточности.
- Отеки у детей.
- Холодные зябкие руки и ноги.
- Чрезмерная потливость ладоней и стоп.
- Нарушения работы желудочно-кишечного тракта: рвота, запоры, энкопрез (недержание кала), может быть энурез (недержание мочи), скрежет зубами во время сна.

Признаки родовой травмы после 5 лет

- Неравная длина ног, укорочение одной из нижних конечностей.
- Нарушение осанки, искривление позвоночника (сколиоз).
- Перекос таза.
- Измененная форма стопы, например, плоскостопие или, наоборот, полая стопа и др.
- Рекурвация коленных и локтевых суставов, т.е. их чрезмерное разгибание или сгибание.
- Синдром беспокойных ног, проявляемый во время ночного сна.
- Болезненные изменения в суставах.
- Метеочувствительность, т.е. на изменения погоды ребенок реагирует ухудшением состояния и самочувствия.
- Повышенная потливость.

- Вегетативно-сосудистая дистония.
- Задержка ЭМЦИОНАЛЬНОГО развития или нарушения в ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ сфере (ребенок возбудим, плаксив, беспокоен, сон плохой).
- Головные боли, головокружения.
- Укачивание в транспорте.
- С началом учебы в школе - повышенная утомляемость, дефицит внимания, трудности с запоминанием, плохая память, ребенку трудно сосредоточиться на выполнении задания, отставание в учебе, плохая успеваемость.
- Гиперактивное расторможенное поведение, немотивированная и непонятная взрослым агрессивность.
- И, наоборот, может быть излишняя пассивность, уход в себя, отчуждение от окружающих, аутизм, поведение, зависимое от сверстников.
- Любые нарушения речи.



Используемая литература:

А.П.Ефимов «РОДОВАЯ ТРАВМА - ПЕРВОПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ»